

Udar, depresja i psychoza wśród komplikacji po Covid-19

2020-07-03

Źródło PAP

[neurologia](#) [psychiatria](#) [Covid-19](#) [udar mózgu](#) [depresja](#)

Pacjenci, u których przebieg Covid-19 był ostry, uskarżają się na poważne problemy neurologiczne – podaje „The Lancet Psychiatry” w oparciu o brytyjskie badania.

Problemy neurologiczne, jakie pojawiają się w związku z ostrym przebiegiem Covid-19, obejmują zaburzenia funkcji poznawczych podobne do demencji, psychozy, stany zapalne oraz depresję i stany lękowe. Pacjenci są także narażeni na udary. Największe ryzyko takiego incydentu występuje u osób powyżej sześćdziesięciu lat. „Udary są dobrze rozpoznaną komplikacją związaną z Covid-19. To, co odkryliśmy w czasie naszych badań, a co było zaskakujące, to fakt, że drugą najczęściej spotykaną komplikacją w związku z przejściem Covid-19, jeśli chodzi o mózg, są zmiany stanu zdrowia psychicznego” – mówi jeden ze współautorów publikacji dr Benedict Michael z Uniwersytetu w Liverpoolu.

Amerykańska psychiatra prof. Jennifer M. Loftis w rozmowie z CNN tłumaczy, że takie powikłania to efekt działania cytokin. Gdy białka te namnażają się podczas Covid-19, ich poziom rośnie m.in. w mózgu, co przyczynia się do upośledzeń neuropsychiatrycznych, takich jak m.in. depresja. Powikłania te pojawiają się również u młodszych pacjentów – podkreślają uczeni. (Rp.pl)